

Vårsæd 2018 – Vedsted Mølle A/S



Vedsted Mølle A/S
Tøndervej 31, Vedsted
6500 Vojens
74545106
Vedstedmoelle@post.tele.dk

Foderbyg

Generelt skal foderbyg have et højt udbytte over flere år, være sund og have lille tendens til aks- og strå nedknækning.

Desuden er det en fordel at sorten har så højt et protein indhold og så god en foderværdi som muligt. Der er i tiden stor fokus på sorterens sundhed, da flere af vores svampemidler har mistet effekt. Dyrkningsteknisk sikres afgrøden med et plantetal på omkring 300 pr. m² samt mindst to svampesprøjtninger for at få så store og sunde kerner som muligt. Giv gerne en mindre mængde kvælstof ved skridning. Et sikkert merudbytte fås ved at tilføre kvælstof og eventuelt også fosfor ved såning. Hav også fokus på sortens stråegenskaber, således at en eventuel vækst-regulering kan sættes ind i tide.

Sort	Egenskaber	Råprotein pct. 2017
Scholar - Nyhed	Stærk økonomisk foderbyg. En af markedets sundeste sorter og ingen lejesæd. Bedsted FESv af afprøvede sorter.	10,8
Ovation	Godt gennemsnit de sidste 3 år. God på lerjord. Kort og lidt blødt strå	10,9
Evergreen	Foderbyg med malt egenskaber. Meget sund sort. Dobbelt nematodresistent.	10,9
Crossway	Stort udbyttepotentiale ved øget kvælstof. Kort og stift strå. Dobbelt nematodresistent.	11,2
Laurikka	Højt udbyttepotentiale og proteinindhold. Tidlig sort. Dobbelt nematodresistent	11,9

Kerneudb. Fht. 2017	Kerneudb. Fht. 2013- 2017	Meldug dækning 2017	Bygrust dækning 2017	Skoldplet dækning 2017	Bladplet dækning 2017	Aks/strå nedkn. 2017
104	103	0	12	0	0,02	4,0/3,5
99	104 *)	0	31	1,0	1,3	2,5/6,0
99	100	0	8	0,3	0,09	1,5/3,0
99	100 *)	0	19	0	1,2	4,5/7,0
97	102	0	23	0,3	2,1	3,0/6,0

Havre

Havre er en sund afgrøde med højt udbyttepotentiale og kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på lettere jordtyper. Den kan desuden dyrkes på mere våde arealer og er samtidig sanerende på andre kornarter. Havre har en forfrugts virkning på niveau med raps og kan samtidig være en værdifuld bestanddel i svinefoder. Vær dog opmærksom på havre-nematoder ved meget vårsæd i sædskiftet.

Forbruget af havre til grynproduktion har de senere år været stigende og derfor er afsætningen inden høst blevet nemmere.

Havresort	Egenskaber
Seldon	Meget høj hektoliter vægt. Meget sund sort. Højt stabilt udbytte.
Emma	Egnet til grynhavre, da den nemt afskalles. Meget lav strå længde. Tidlig sort
Dominik	Dobbelt nematoderesistent. Meget lav strå længde. Lav tendens til lejesæd.

Kerneudb. Fht 2017	Kerneudb. Fht. 2013- 2017	Hekto- litervægt 2017	Meldug dækning 2017	Bladplet dækning 2017	Strå-længde 2017	Lejesæd kar. 0-10 2017
100	99	53,8	18	6	97	1,8
97	101*)	49,4	13	6	83	1,1
94	97	50,9	11	5	81	1,0

Kilde: Landsforsøg i Sortinfo

*) 2016-2017

Vårhvede

Vårhvede er oplagt som brødhvede, pga. det naturligt høje protein indhold og i dag er udbytterne så høje at de godt kan konkurrere med vårbyg. Kan dyrkes på alle jordtyper, dog kræves vanding på lettere jordtyper. Da vårhvede er en åben afgrøde er konkurrencen fra ukrudt stor, og derfor kræves et større plantetal end andre arter. Protein indhold er højt og vårhvede har derfor også en stor værdi til fodring. Alle sorter er på brødhvedelisten.

Da der til det kommende forår, vil være et markant større areal tilsået med vårhvede, forventer vi en øget forespørgsel på vårhvede til brødproduktion. Der er dog begrænsninger på, hvor meget der kan afsættes.

Vårhvedesort	Egenskaber
Harenda - Nyhed	Årets topscorer i Landsforsøgene Meget høj hektolitervægt Tidlig sort
Happy - Nyhed	Tidlig sort Høj hektolitervægt Sund sort på meldug og septoria
KWS Bittern	Godt udbytte i flere år Meget stråstiv sort Meget højt protein- og gluten indhold

Kerneudb. Fht 2017	Kerneudb. Fht. 2013- 2017	Hekto- litervægt 2017	Meldug dækning 2017	Gulrust dækning 2017	Strålængde 2017	Modnings dato 2017
104	103*)	80,4	0,6	0	81	14/8
103**)	-	78,1 **)	0 **)	9 **)	85 **)	14/8 **)
95	100	76,8	1,7	0,2	80	17/8

*) 2016-217 **) 2016 tal

Kilde: Landsforsøg i Sortsinfo

Markært og hestebønne

Med stigende krav om vårsåede afgrøder i sædskiftet, samt høje priser på protein, er der opstået fornyet interesse for dyrkning af både markært og hestebønner. Begge afgrøder er gode og sanerende forfrugter til korn, primært fordi de efterlader en del kvælstof i rødderne.

Da både ærter og hestebønner stiller store krav til sædskiftet, anbefales det at der holdes mindst 4-5 frie år mellem den enkelte afgrøde, også imellem markært og hestebønner.

Begge afgrøder trives bedst på sandmuldede lerjorde eller sandjorde med mulighed for vanding, da især hestebønner er meget tørkefølsomme. Reaktionstallet samt jordbundstal for kalium og fosfor skal være middelhøje til høje, da rodnettet, især i markært ikke er så dybtgående.

Mærkærtsort	Egenskaber
Ingrid	Forholdstal 103 i gennemsnitsudbytte 2013-2017 Høj tusindkornsvægt Høj stængelstyrke
Javlo	Den mest efterspurgte sort til helsæd Højt udbytte Høj foderkvalitet

Hestebønnesort	Egenskaber
Fuego	Stabilt højt udbytte siden 2013 Lavt indhold af tannin Højt proteinindhold samt høj tusindkornsvægt

Beregning af udsædsmængde:

Plantetal pr. m² * TKV

% markspiring (max 90) = udsædsmængde pr. ha

Retningsgivende planteavl pr. m²

Vårbyg malt	250-275	Vårhvede	400-425
Vårbyg foder	275-300	Ærter	50-70
Havre	275-325	Hestebønner	50-60